

1. **Código :**
2. **Nombre de la Tecnología:** Tebuconazol+Triadimenol (Fungomax)
3. **Recopilado por:** Carlos Manuel Oviedo Zamora **Correo:**ing_oza07@yahoo.es
4. **Desarrollada por:** BASF
5. **Ámbito de la tecnología:** Control de plagas
6. **Descripción de la Tecnología:**

Clase: Fungicida.
Grupo Químico: Triazol.
Ingrediente Activo: Tebuconazol + Triadimenol.
Concentración: 22.5% + 7.5 %.
Formulación: Suspensión Concentrada (SC).
Clasificación Toxicológica: Grupo III. Producto poco peligroso.
Modo de acción: Actúa por vía sistémica en forma preventiva y curativa.
Nombres Comerciales: Fungomax 30 EC, Silvacur Combi 30 EC.

7. Como Aplicar la Tecnología:

Cultivos:


Recomendaciones de uso para Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana: Café, Arroz, Hule, Tomate, Macadamia, Cebolla, Ajo, Banano, Maní y Sandía. Uso recomendado para Costa Rica: Arroz, Café, Banano, Plátano.

Enfermedades a Controlar: Pudrición del tallo y pudrición de la vaina *Rhizoctonia sp.*, Ojo de Gallo *Mycena citricolor*, Mancha de Hierro *Cercospora coffeicola*, Roya o Herrumbre *Hemileia vastratrix*, Mal de Hilachas *Corticium sp.*, Koleroga *sp.* Antracnosis *Colletotrichum coffeanum*, Mal rosado *Corticium salmonicolor*, Cáncer del tallo *Ceratostyxis limbrata*, *Oidium heveae*, Mancha de la hoja *Microcylus ulei*, Tizón temprano *Alternaria solani*, Pudrición Negra *Botrytis sp.* Mancha gris *Stemphylium solani*, Mancha gris *Cladosporium sp.*, Pudrición de la flor *Botrytis sp.*, Mancha de la hoja *Alternaria sp.*, Mancha rosada *Alternaria porri*, Pudrición del tallo *Botrytis allii*, Mildiu *Peronospora destructor*.

Modo de empleo equipo terrestre: Las aplicaciones se realizan con equipo manual o motorizado de mochila, equipo accionado por tractor. Previo a la aplicación verifique que el equipo de aspersión esté en buen estado de funcionamiento y debidamente calibrado. Para aplicar este producto se recomienda utilizar boquillas tipo CONO.

Modo de empleo equipo aéreo: Las aplicaciones se realizan con equipo accionado avión equipado para aspersiones agrícolas. Previo a la aplicación verifique que el equipo de aspersión esté en buen estado de funcionamiento y debidamente calibrado. Para aplicar este producto se recomienda utilizar boquillas tipo CONO. Aplicar con aspersor de mochila, equipo accionado con tractor o avión equipado para aspersiones agrícolas. Utilice boquilla de cono.

Dosis Recomendada: 280-500 cc/mz. Periodos de Aplicación: Iniciar con las aplicaciones de los primeros síntomas de las enfermedades o al inicio de las lluvias, repitiendo cada 15-45 días. Periodo de Reingreso: Esperar que el rocío del caldo se seque sobre el follaje.



Periodo de aplicación cosecha: 21 días. **Compatibilidad:** No reportadas incompatibilidades excepto con sustancias alcalinas.

Fitotoxicidad: No reportadas en las condiciones de uso dadas.