







1. Código:

2. Nombre de la Tecnología: DICTA-122

3. Recopilado por: Correo:

4. Desarrollada por: DICTA/SAG

5. Ámbito de la tecnología: Variedad

6. Descripción de la Tecnología:

**DICTA-122.** Variedad de fríjol que presenta las siguientes características agronómicas:

Color del grano: rojo retinto

Rendimientos promedios: 28 QQ/Mz,

Adaptación: puede cultivarse desde 400 a 2000 msnm, el pH del suelo ideal es 6.5 y 7.5, sin

embargo, el comportamiento de esta variedad es bueno en suelos con pH de 4.5 y 5.5,

Ciclo vegetativo: 63 a 72 días, Porte: hábito de crecimiento II,

**Resistencia**: es resistente al Virus del Mosaico Común del Fríjol y al Picudo de la Vaina; con una resistencia intermedia a las siguientes enfermedades: al Virus del Mosaico Dorado, Bacteriosis, a la Mustia Hilachosa, Antracnosis, Roya, Mancha Angular.

Liberado por DICTA/SAG en 1997.

## 7. Como Aplicar la Tecnología:

Para la siembra de primera en monocultivo se deben distribuir 10 semillas por metro lineal en surcos separados a 50 centímetros, utilizando 100 libras de semilla por hectárea o sea 75 libras por manzana, con ello se puede alcanzar una población de 220,000 plantas por hectárea o sea 154000 plantas por manzana.

Para el ciclo de postrera se debe procurar alcanzar a la madurez fisiológica de la planta, una población ideal de 275,000 plantas/ha, lo que equivale a sembrar 10 semillas por metro lineal en surcos separados a 40 centímetros, utilizando 108 libras/ha o sea 75 libras de semilla /manzana.

Para la siembra en relevo, es recomendable alcanzar la madurez fisiológica de la planta de fríjol con una población ideal de 200,000 plantas/ha, o sea 140,000 plantas/mz, lo que equivale a sembrar de 3 a 4 semillas/postura separadas a 40 centímetros al cuadro entre surcos de maíz. Esta siembra es típico de postrera, principalmente en el Valle de Jamastrán, El Paraíso; Siria en Francisco Morazán; Yoro; Guayape y Lepaguare en Olancho; La Entrada, Copán; Santa Bárbara; El Rosario, Comayagua y otras zonas.

Fertilización: Si no hay un análisis de suelo, se recomienda de forma general, para zonas de valles y laderas, 2qq/mz de la fórmula 18-46-0; aplicado al momento de la siembra, si utiliza labranza convencional y en siembra de ladera se recomienda hacerlo a la emergencia del cultivo.

Para el control de malezas, hacer control mecánico o aplicar productos químicos de acuerdo al tipo de malezas presentes en el área de siembra.









Debe realizarse control de plagas durante el ciclo del cultivo, según recuento y umbral de daño económico.

## 8. Beneficios de su empleo:

*Económico*: Variedades con un alto potencial productivo, permitiendo obtener mayores beneficios económicos para los productores.

Social: Sus altos rendimientos garantizan la seguridad alimentaria de las familias productoras y de la población en general.