

1. **Código :**
2. **Nombre de la Tecnología:** SILVACUR
3. **Recopilado por:** Ing. Chester D. James Law      **Correo:**
4. **Desarrollada por:** Bayer Crop Science
5. **Ámbito de la tecnología:** Control de plagas
6. **Descripción de la Tecnología:**

**Fungicida Triazol**  
**Clase:** Fungicida  
**Grupo Químico:** Triazol  
**Ingrediente Activo:** Tebuconazol, Triadimenol  
**Concentración:** Tebuconazole 22.5% Triadimenol 7.5%  
**Formulación:** Concentrado Emulsionable (EC)  
**Clasificación Toxicológica:** Ligeramente peligroso (III)  
**Banda Toxicológica:** Azul  
**Modo de Acción:** Silvacur Combi 30 EC, es un fungicida eficaz con efecto sistémico. Se absorbe por los ectodesmos y luego se transporta vía xilema a todo el vegetal. Es de efecto preventivo, curativo y erradicante.  
**Mecanismo de Acción:** Es un inhibidor de la biosíntesis del ergosterol.  
**Ventajas:** Control eficaz de varias enfermedades foliares y de suelo con un sólo producto

## 7. Como Aplicar la Tecnología:

### Datos de Aplicación

**Cultivos: Recomendaciones** de uso para Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana: Café, Arroz, Hule, Tomate, Macadamia, Cebolla, Ajo, Banano, Maní y Sandía. Uso recomendado para Costa Rica: Arroz, Café, Banano, Plátano.

**Modo de empleo equipo terrestre:** Las aplicaciones se realizan con equipo manual o motorizado de mochila, equipo accionado por tractor. Previo a la aplicación verifique que el equipo de aspersión esté en buen estado de funcionamiento y debidamente calibrado. Para aplicar este producto se recomienda utilizar boquillas tipo CONO.

**Modo de empleo equipo aéreo:** Las aplicaciones se realizan con equipo accionado avión equipado para aspersiones agrícolas. Previo a la aplicación verifique que el equipo de aspersión esté en buen estado de funcionamiento y debidamente calibrado. Para aplicar este producto se recomienda utilizar boquillas tipo CONO.

**Intervalo de aplicación:** Depende de cada cultivo recomendado. Intervalo entre la última aplicación y la cosecha: 21 días.

**Intervalo de reingreso al área tratada:** Para banano: 2 horas. Resto de cultivos: 24 horas.

**Fitotoxicidad:** No se conocen casos de fitotoxicidad si se aplica según las recomendaciones.

**Compatibilidad:** Silvacur Combi 30 EC se puede mezclar con fungicidas de uso común, Bayfolan Forte y surfactante.