

1. **Código :**
2. **Nombre de la Tecnología:** Lorsban Granulado 5G
3. **Recopilado por:** DICTA **Correo:**
4. **Desarrollada por:** Agromesa
5. **Ámbito de la tecnología:** Control de plagas
6. **Descripción de la Tecnología:**

Insecticida Granulado

Ingrediente activo:

Clorpirifos etil: 0,0-dietil 0-(3,5,6-tricloro 2-piridinil) fosforotioato:5.00%
(Equivalente a 50 g de I.A./kg)

Ingredientes inertes:

Diluyente, adherente y compuestos relacionados: 95.00%

Total: 100.00%

Precaución:

- *Puede ser nocivo en contacto con la piel
- *Puede ser nocivo en caso de ingestión
- *Puede ser nocivo si se inhala

7. Como Aplicar la Tecnología:

Instrucciones de uso:

Siempre calibre el equipo de aplicación

Información general: LORSBAN* 5G es una formulación granular lista para usarse.

Puede ser aplicado usando equipos terrestres manuales de tipo “salero” y/o equipos terrestres para tractor.

Úsese exclusivamente en los cultivos y plagas aquí recomendados

Cultivos: Maíz y sorgo.

LORSBAN* 5G es un insecticida especialmente recomendado para el control de:

Plagas de la raíz: Gusano alfilerillo (*Diabrotica spp*), Gallina ciega (*Phyllophaga sp*, *Macrodactylus sp*, *Strategus sp*, *Cyclocephala sp*, *Cotinis sp*, *Euphoria sp*), Gusano de alambre (*Ischidiontus sp*, *Megapenthes sp*, *Pyrophorus mexicanus*, *Melanotus sp*, *Agriotes lineatus*) y Larvas de colaspis (*Colaspis sp*).

Periodo de reentrada al área tratada: 24 horas.

Método para preparar y aplicar el producto: Para el control de estos insectos se recomienda aplicar el insecticida en banda en el momento de la siembra a una dosis de 15 a 25 kg por hectárea.

En aplicación total, utilizar de 50 a 60 kg por hectárea, previo a la siembra, incorporando el insecticida al suelo con un paso de rastra a 5-10 cm de profundidad.

Contraindicaciones: No se aplique en cultivos para los que no tiene recomendación de uso en la etiqueta.

Fitotoxicidad: El producto no es fitotóxico si es aplicado según instrucciones de la etiqueta.

Incompatibilidad: No mezclar con productos de reacción altamente alcalina, en caso de requerirse puede ser aplicado con el fertilizante al momento de la siembra.

Manejo de resistencia: Para prevenir el desarrollo de poblaciones resistentes, siempre respete las dosis y las frecuencias de aplicación; evite el uso repetido del producto, alternándolo con otros grupos químicos de diferentes modos de acción y diferentes mecanismos de detoxificación y mediante el apoyo de otros métodos de control.