

1. **Código :**
2. **Nombre de la Tecnología:** TERBUFOS (COUNTER)
3. **Recopilado por:** Ing. Chester D. James Law **Correo:**
4. **Desarrollada por:** Basf
5. **Ámbito de la tecnología:** Control de plagas
6. **Descripción de la Tecnología:**

TERBUFOS (COUNTER)

Insecticida-nematicida
Granulado

Ingrediente activo: Terbufos: S-[[1, 1-dimetil etil)tio] metil) 0,O-dietil fosforoditioato

No menos de:15.00% (Equivalente a 150 g I.A./kg)

Ingredientes inertes: Complejo de celulosa

No más de: 85.00%

Total: 100.00%

Toxicidad: Altamente toxico

Precauciones y advertencias de uso: Puede ser mortal si se ingiere, se inhala o se absorbe a través de la piel. La inhalación repetida o el contacto repetido con la piel puede, sin presentar síntomas, aumentar progresivamente la susceptibilidad al envenenamiento. Evítese el contacto con los ojos, la piel y la ropa. Evítese respirar el polvo.

Cuando maneje o aplique el producto debe usarse la ropa y equipo de protección completo: guantes de goma, botas de hule, gorra, overol, anteojos irrompibles y mascarilla especial para insecticidas. Báñese después de cada jornada de trabajo y lave la ropa usada durante la aplicación con abundante agua y jabón. Al lavar esta ropa no la mezcle con la de uso normal.

7. Como Aplicar la Tecnología:

Instrucciones de uso: Siempre calibre el equipo de aplicación

COUNTER® FC 15% G es recomendable para los cultivos descritos en el cuadro.

Método de aplicación: COUNTER® FC 15% G es un insecticida-nematicida para su aplicación en maíz, Frijol, plátano y caña de azúcar. El equipo de aplicación debe estar en buenas condiciones de uso. Evite respirar el polvo cuando se carga el equipo y cuando se maneje o aplique el producto debiendo usar ropa y equipo de protección completo: guantes y botas de hule, gorra, anteojos, overol y mascarilla especial para insecticidas. Evite que el producto alcance a otras personas. Aplique todo el producto con el equipo de aplicación.

Recomendaciones y aplicación: Maíz y sorgo: Una aplicación, al momento de la siembra, colocando los gránulos en una banda de 18 cm sobre el surco, detrás de la zapata de la sembradora y delante de la rueda prensadora.

Muy importante: El producto debe aplicarse mezclado con el fertilizante, no debe usarse solo a menos que se aplique con equipo especial para aplicar insecticidas granulados. El intervalo entre la última aplicación y la cosecha en estos cultivos es de 60 días y queda determinado de por sí, por el uso temprano del producto.

Periodo de reingreso: Esperar 48 horas después de la aplicación para reingresar a las áreas tratadas. Cuando existan caminos, casas o pasos dentro o cerca de las áreas tratadas, deben colocarse rótulos que indiquen “Campo tratado con insecticida no ingrese”, especificando la fecha de reingreso.

Cultivo: Maíz, Sorgo, Frijol

Dosis: 7 kg/ha

Plagas: Gallina ciega (*Phyllophaga* spp), Mayate rayado (*Colaspis* spp), Diabrotica (*Diabrotica* spp), Gusano de la semilla (*Hylemia platura*), Gusano de alambre (*Melanotus* spp).

Contraindicaciones: Ninguna en especial que las ya mencionadas anteriormente.

Incompatibilidad: COUNTER® FC 15% G únicamente se puede mezclar con fertilizante al momento de la siembra. Las mezclas deberán de hacerse únicamente con productos registrados y autorizados en los cultivos indicados en la etiqueta.

Fitotoxicidad: COUNTER® FC 15% G no es fitotóxico, si se usa en la forma aquí recomendada.